


# КОВБОЙСКАЯ ФАРМАКОПЕЯ











Справочник психоактивных лекарственных средств

























Редакция двадцать третья (v023) от 14.10.2024 г.









*Better living through chemistry*





Бред+  
Аптечных ковбоев тред








Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг		Время действия, ч		Зависимость <sup>9</sup>	Отбивка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>				
									RU	BY	UA	KZ							
Эфедрин Бронхолитин, Бронхотон	Стимулятор		Настоящий амфетаминоподобный стимулятор. Алкалоид эфедры. Продается в виде крайне противных на вкус травяных сиропов, которые помимо прочего содержат глауцин, перекрывающий часть побочек и тоже обладающий психоактивными свойствами. При этом за чистый эфедрин предусмотрена статья. Используется какками, в теории так же можно применять для похудения или от СДВГ. Пить как есть, не отбивая, если вы только не собрались варить винт, ну или вас тошнит от поглощения неприятных на вкус жидкостей. Начинает действовать через полчаса, но время действия обычно недолгое. Сильно сужает сосуды. Эфедрин и псевдоэфедрин выводятся с мочой в неизменном виде. <b>Внимание: стимуляторы могут вызывать тахикардию, гипертензию, вазоконстрикцию. Сердечникам пить с осторожностью. Для купирования побочек есть магний и ниацин<sup>12</sup>.</b>	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория, понижение аппетита	Бессонница, вазоконстрикция, тахикардия, гипертензия, температура	Амфетамины, х-NBOMe, DO-х, ипомея, ИМАО	5	3	55	115	4	9	Слабая	КЦЗ	Средне	?	Без рецепта	?
Псевдоэфедрин Кафетин Колд	Стимулятор		Похуже на эфедрин, но больше стимуляции, и меньше эйфории. Сильно разгоняет сердце и сужает сосуды, как и эфедрин. Покупается в виде таблеток с DXM (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола, так как парацетомол чрезвычайно токсичен, и попытка жрать неотбитым обернется отказом печени. Способа разделить DXM и псевду пока не нашли.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория, понижение аппетита	Бессонница, вазоконстрикция, тахикардия, гипертензия, температура	Амфетамины, х-NBOMe, DO-х, ипомея, ИМАО	5	3	100	200	4	9	Слабая	Холодная вода	Средне	Списки	?	?
Метилксансамин DMAA	Стимулятор		Он же "герань". Когда-то известное в кругах качков вещество, покупалось у спортпит барыг и во всяких магазинах БАДов, в аптеках не продавалось. С недавнего времени в РФ запрещено и больше не продается никак. В других странах возможно легально. Ингибирует обратный захват норадреналина, не трогая дофамин и серотонин, дает более физическую стимуляцию нежели умственную. Разгоняет сердце и ебет сосуды.	Релизер и ИОЗ норадреналина	Стимуляция, понижение аппетита	Бессонница, вазоконстрикция, тахикардия, гипертензия	Амфетамины, х-NBOMe, DO-х, ипомея	3	3	50	500	6	10	Нет или неизвестно		Список I/II	?	?	?
Туаминогептан Ринофлумуцил, Риностей	Стимулятор		Нечто похуже на герань, но слабее и короче. Продается как спрей от насморка, в составе которых еще есть АЦЦ, но скорее всего можно пить и без отбивки. В одном пузырьке действующего вещества мало, а стоят они не так уж и дешево.	Релизер и ИОЗ норадреналина	Стимуляция, понижение аппетита	Бессонница, вазоконстрикция, тахикардия, гипертензия, головокружение	Амфетамины, х-NBOMe, DO-х, ипомея	2	2	50	?	2	3	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Сибутрамин Голдлайн, Редуксин	Стимулятор		Средство для похудения, отбивает аппетит. Также нечто амфетаминоподобное. Дает неприятную стимуляцию, тряску, мазню, и прочие эффекты похуже на СИОЗС антидепрессанты. Возможно использование для СДВГ, но не слишком эффективное. Дорогое. За заказ средств кроме официально зарегистрированных в РФ будет бутылка, через границу перевозить так же нельзя.	ИОЗ серотонина <sup>13</sup> , норадреналина и дофамина	Стимуляция, понижение аппетита	Бессонница, тахикардия, аритмия, гипертензия, головная боль, тошнота, задержка мочи	Мускат, СИОЗС, трамадол, талентадол, нефопам, DXM, MDMA, ИМАО, 5-НТФ	3	4	15	60	6	10	Слабая		Трудно	Нет в аптеках	?	?
Тезофензин Тезолайт	Стимулятор		Еще одно лекарство для жиробасов. Примечательно своей химической структурой, похуже на кокаин, хотя по эффектам скорее должно быть ближе к сибутрамину. Официально не продается, у спортпит-барыг стоит дорого, омичами не исследовано.	ИОЗ серотонина, норадреналина и дофамина	Стимуляция, понижение аппетита	Бессонница, тахикардия, головная боль, тошнота, сухость во рту	Мускат, СИОЗС, трамадол, талентадол, нефопам, DXM, MDMA, ИМАО, 5-НТФ	?	?	?	?	?	?	Слабая		Нет в аптеках	Нет в аптеках	?	?
Атомоксетин Страттера, Когнитера	Стимулятор		Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа. Разгоняет и мажет, без эйфории. Стоит дорого, но у индусов можно заказать значительно подешевле. Есть мнение, что самая пиздатая именно страттера, а индусские варианты говно, но ее сейчас уже хуй найдешь в аптеках. Метаболизируется через CYP2D6.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, вазоконстрикция, тошнота, задержка мочи		3	4	25	120	4	6	Нет или неизвестно		Средне	Нет в аптеках	Нет в аптеках	Средне
Модафинил UA: Нувиджил	Стимулятор		Изначально лекарство от нарколепсии, подходит так же как более пиздатая замена атомоксетину или чтобы подолгу не спать. В России больше недоступен, за попытку заказа у индусов скорее всего будет сгуха. В Украине есть в виде чистого R-модафинила, в Казахстане покупается в магазинах для качков. По ноздре прет сильнее, расход чуть меньше, но и действие короче.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		4	5	100	400	5	10	Нет или неизвестно		Список I/II	Списки	Легко	Нет в аптеках
Гидрафинил Флуоренал	Стимулятор		Как модафинил, только значительно слабее. В РФ не запрещен, но в аптеках не продается, покупать в интернете или как БАД для качков. Инфы о применении нет.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		?	?	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Нет в аптеках	Нет в аптеках	?	?
Бупропион	Стимулятор		Еще один ныне запрещенный в РФ психостимулятор, считается прекурсором катинонов, были случаи набутивания за попытку провезти. В других странах продается как антидепрессант, но так же подходит для СДВГ и бросания курить. В очень больших дозах вызывает делирий. Метаболизируется CYP2D6.	ИОЗ дофамина и норадреналина, Н-холинolitik	Стимуляция, эйфория	Тахикардия, тошнота		4	5	150	300	8	12	Слабая		Список I/II	Нет в аптеках	Трудно	Нет в аптеках
Кофеин	Стимулятор		Кофе в таблетках. Можно пить так, можно толочь и нюхать, хотя в таком случае будет закладывать нос из-за наполнителя. От наполнителя можно отбить, растворив в воде, отфильтровав через марлю, и выпарив раствор. Можно закидывать вместе с нормальными стимуляторами, чтоб усилить действие. В очень больших дозах вызывает стимуляторный психоз.	Антагонист аденозиновых рецепторов	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, головная боль, частое мочеиспускание		3	3	50	800	2	4	Слабая		Легко	Легко	Легко	?
Йохимбин BY: Йохимбек-гармония	Стимулятор		Средство для потенции, афродизиак, кроме того используется какками. Алкалоид йохимбе (внезапно). Дает неприятную стимуляцию, более телесную чем умственную, в отличие от кофеина и рацетамов. Расширяет сосуды.	Антагонист альфа-2 адренорецепторов, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2, D2, D3	Стимуляция, повышение либидо	Бессонница, тахикардия, судороги, головная боль		3	3	5	20	2	4	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?









Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг		Время действия, ч		Зависимость <sup>9</sup>	Отбивка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>				
									RU	BY	UA	KZ							
Фенилпирacetам <i>Фенотропил, Фонтурacetам, Нанотропил, Актипропил</i>	Стимулятор		Ноотропное средство. Дает слабую стимуляцию, более умственную чем телесную. Кросс-толер с другими рацетамми. Можно пить курсами. Фенотропил, как и прочие рацетамы, вроде бы как могут разгонять другие вещества, особенно стимулы, но инфы об этом немного. Выводится в неизменном виде. Стоит недешево.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль, бессонница		3	3	100	500	3	5	Нет или неизвестно		Легко	?	Нет в аптеках	?
Омберацетам <i>Ноопепт</i>	Стимулятор		Похуже на фенотропил. Нужно заноживать, так как перорально не усваивается. Наполнитель забивает нос, отбивка предположительно как с кофеином. Какой идиот придумал выпускать это в таблетках - непонятно. Еще вроде можно рассасывать под языком.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль, бессонница		3	3	20	40	3	5	Нет или неизвестно		Без рецепта	Нет в аптеках	?	?
Прамирацетам <i>UA: Прамистар</i>	Стимулятор		Украинский ответ фенотропилу, в РФ не продается. Действует чуть дольше, а так все то же самое.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль, бессонница		3	3	600	1800	4	7	Нет или неизвестно		Нет в аптеках	Нет в аптеках	Легко	?
Пирацетам <i>Тиоцетам</i>	Стимулятор		Самый слабый из ноотропов, с невыраженными эффектами. Лучше достать его более сильные производные. Хотя по уверениям некоторых все еще разгоняет другие вещества.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		1	2	2000	8000	4	8	Нет или неизвестно		Легко	?	Легко	?
IDRA-21	Стимулятор		Research chemical с эффектами наподобие фенотропила, только долгого действия. В аптеках в РФ не продается, но можно купить онлайн как БАД. Толком никем не опробован.	AMPA модулятор	Стимуляция	Головная боль		3	3	3	15	8	26	Нет или неизвестно		Нет в аптеках	Нет в аптеках	?	?
Бетагистин <i>Бетасерк</i>	Стимулятор		Дает интересное чувство ясности в голове и вроде как стимуляцию, хотя может это и плацебо. Нужно нюхать, но очень жжет нос. Рекомендуют отбивать от наполнителя выпариванием и закапывать, но и так все равно жжет.	Ингибитор диаминооксидазы	Стимуляция	Жжение слизистой при заноживании		1	X	50	100	1	2	Нет или неизвестно		Без рецепта	Без рецепта	Легко	?
Бромантан <i>Ладастен</i>	Стимулятор		Родственник мидантана и мемантина, но без диссоциативных эффектов, а только со стимуляцией. В общем, штука для любителей ноотропов. В России когда-то производился под названием Ладастен, но давно уже пропал и неизвестно вернется ли. Однако, его все еще можно найти в онлайн магазинах торгующих БАДами.	ИОЗ серотонина, норадреналина и дофамина	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, аритмия	Мускат, СИОЗС, трамадол, тапентадол, нефопам, DXM, MDMA, ИМАО, 5-НТФ	3	3	50	250	6	10	Нет или неизвестно		Нет в аптеках	Нет в аптеках	?	?
Никотин <i>Никоретте</i>	Стимулятор		Сегореты в виде жевачки. В основном применяются для бросания курить, вряд ли кому-то придет в голову этим упарываться. Но мало ли.	Н-холиномиметик	Стимуляция	Тошнота, слюнотечение, головокружение, потливость, колики, аритмия		2	X	2	8	1	2	Очень сильная		Без рецепта	?	?	?
Галантамин <i>ВУ: Нивалин</i>	Стимулятор, Диссоциатив		Агонист ацетилхолиновых рецепторов и ингибитор ацетилхолинэстеразы, то бишь отравя типа ФОС и новичка, только послабее. То есть от передозировки можно мучительно умереть в судорогах, если кто еще не понял. Вероятно так же аддитивен как и никотин, но желаных подсесть на него не наблюдается. Может снизить действие холинолитиков, если вы по какой-то причине травитесь еще и этой гадостью. Помимо этого возможно является слабым диссоциативом, и должен разгонять другие диссы, что уже более интересно с точки зрения торчелогии, но проверено это не было. Принимать с большой осторожностью. Метаболизируется CYP2D6 и CYP3A4, гепатотоксичен.	Ингибитор АЦХ, Н-холиномиметик, NMDA антагонист	Стимуляция, диссоциация, красочные сновидения	Тошнота, слюнотечение, потливость, колики, аритмия, нарушения пищеварения, токсический гепатит		?	X	4	24	6	12	Нет или неизвестно	?	?	?	?	
Дифенгидрамин <i>Димедрол, Антигипипин, Леверсо</i>	Делириант		Классика холинолитиков. Продается в ампулах, либо в таблетках в смеси с другими веществами. Изредка можно найти чистый в таблетках. Можно использовать как снотворное. Как и любое другое холиногено, не дает ничего, кроме мерзких ощущений, амнезии и палева. Передозы смертельно опасны из-за кардиотоксичности. В делирии можно совершить потенциально опасные для жизни действия. При длительном употреблении в больших дозах вызывает деменцию. Категорически не рекомендуется к употреблению.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, задержка мочи		1	3	100	700	5	10	Слабая	Легко	Без рецепта	?	?	
Гиосцин <i>Бускопан</i>	Делириант		Действующее вещество дурмана в виде бутилбромида. Ходят слухи что его нужно курить как соль. Но инфы об употреблении мало.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		1	X	?	?	3	4	Слабая	Без рецепта	?	?	?	
Тропикамид <i>Тропикам</i>	Делириант		Капли в глаза нос. Прет слабо. Примечательны тем что им кололись опиятные торчи, видимо от чесотки, после чего его внесли в списки несмотря на непричь.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		1	X	?	?	?	?	Слабая	ПКУ	?	?	?	
Циклопентолат <i>Цикломед, Циклоптик</i>	Делириант		Еще одни капли для расширения зрачков. Вот эти уже прут хорошо. Капать от 4 капель. Действует относительно недолго, сравнительно с другими холинолитиками. В связи с интраназальным употреблением эффект возникает быстро и резко.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, задержка мочи		2	X	2	8	4	8	Слабая	ПКУ	?	?	?	













Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг	Время действия, ч	Зависимость <sup>9</sup>	Отбивка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>				
													RU	BY	UA	KZ	
Атропин	Делириант	Тропан 	Царь всех холинолитиков и действующее вещество белладонны. Опять же капли, которые капают мимо глаз прямо в нос, хотя кто-то говорит что можно просто пить. Но лучше не нужно. Ни капать, ни пить.	М-холинолитик	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, задержка мочи					Слабая		ПКУ	?	?	?	
Платифиллин	Делириант	? 	И еще один атропиноподобный препарат, продается в ампулах. Если верить инструкции, то по силе сравним с атропином и при этом дает меньше побочных чем атропин. Омичами похоже не изучен, да и вряд ли кто его будет изучать.	М-холинолитик	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, задержка мочи					Слабая		?	?	?	?	
Дицикловерин <i>Триган-Д;</i> <i>UA: Комбиспазм</i>	Делириант	? 	Тоже классический холинолитик, и когда-то в прошлом излюбленное вещество школьников. Обязательно отбивать от парацетамола холодной водой, упаривание в неотбитом виде приведет к смерти от отказа печени. Несколько лучше чем антигистаминами.	М-холинолитик	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, задержка мочи			100	300	5	12	Слабая	Холодная вода	Средне	?	Без рецепта
Оксибутинин <i>Дриптан</i>	Делириант	? 	Еще один чистый холинолитик без сильных антигистаминных побочных. В таблетках, отбивки не требует, но стоит дорого. Отличается быстрым началом действия, и короткой продолжительностью. Инфы о применении мало.	М-холинолитик	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, задержка мочи			15	40	1	2	Слабая		?	?	?
Дименгидрилат <i>Авиамарин, Драмина</i>	Делириант, Стимулятор	Этаноламин / ксантин 	Средство от тошноты и укачивания. В организме распадается на все тот же димедрол и 8-хлоротеофеллин, стимулятор типа кофеина. Стимулирует, не так хочется спать как от димедроло. Более кардиотоксичен чем многие другие холинолитики. От тошноты действительно помогает, блевануть под ним тяжело, что делает передозы еще более опасными.	М-холинолитик, антигистамин, антагонист аденозиновых рецепторов	Морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, задержка мочи			250	750	5	10	Слабая		Без рецепта	?	Без рецепта
Доксиламин <i>Донормил, Слипзон</i>	Делириант	Этаноламин 	В целом похоже на димедрол, только еще больше хочется спать, и действует значительно дольше. Продается как снотворное. Некоторые уверяют, что он обладает анксиолитическими свойствами. Возможно так же меньше бьет по памяти, если использовать в качестве снотворного, но в отличие от многих других препов, снотворный эффект может сохраняться утром.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, задержка мочи			75	450	8	24	Слабая		Легко	Без рецепта	?
Хлоропирамин <i>Супрастин</i>	Делириант	? 	Еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Как снотворное довольно слабое.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия			250	1750	4	6	Слабая		Без рецепта	?	?
Клемастин <i>Тавегил</i>	Делириант	Этаноламин 	И еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Тысячи их. Посильнее супрастина, но все еще слабее димедроло и дономрила.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия			?	?	?	?	Слабая		Без рецепта	?	?
Тригексифенидил <i>Циклодол, Паркопан</i>	Делириант	? 	Средство для купирования побочных нейролептиков. В отличие от прочих холинолитиков может давать приятные эффекты. Достать почти нереально, разве что спиздить из ПНД.	М-холинолитик	Эйфория, седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, задержка мочи			1	6	6	12	Сильная		ПКУ	?	?
Бипериден <i>Мендилекс</i>	Делириант	? 	Тоже препарат от нейролептической тряски и паркинсонизма. Инфы о нем мало, скорее всего что-то более близкое к центральному холинолитикам чем к антигистаминам.	М-холинолитик	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия			?	?	?	?	Слабая		Трудно	?	?
Гидроксизин <i>Атаракс</i>	Делириант, Нейролептик	? 	Якобы анксиолитик, на самом деле нечто димедролоподобное. Врачи почему-то очень любят его выписывать как снотворное и успокоительное, и некоторые даже говорят что им помогает, возможно снижает тряску из-за адrenoблолирующего действия. Имеет эффекты схожие с атипичными нейролептиками, только гораздо слабее.	М-холинолитик, антигистамин, альфа адреноблокатор, антагонист 5-HT 2, D2	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, гипотензия, тахикардия, аритмия			50	300	5	14	Слабая		Трудно	?	?
Прометазин <i>Пипольфен</i>	Делириант, Нейролептик	? 	Еще один димедролоподобный якобы анксиолитик, с более сильным привкусом нейролептиков, однако все еще слишком слабый для снятия с психозов. Самое мощное из антигистаминных снотворных. Популярен у американских негров как средство от опиятной чесотки от кодеиновых сиропов.	М-холинолитик, антигистамин, альфа адреноблокатор, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2, D2, D3	Седация, овоочное состояние, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, гипотензия, тахикардия, аритмия			25	100	4	11	Слабая		Трудно	?	?











Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг		Время действия, ч		Зависимость <sup>9</sup>	Отбивка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>				
									RU	BY	UA	KZ							
Бензидамин <i>Тантум Роза , Тантум Верде</i>	Делириант, Стимулятор	Индазол 	Порошок для пизды. Серьезно. Требуется отбивка, чтобы не жрать повареную соль в огромных количествах. Есть еще в полоскалках для горла, но там мало вещества, их нужно пить литрами, они не отбиваются и имеют крайне мерзкий вкус. Действие странное, нехарактерное для холинолитиков, похоже больше на стимуляторный психоз. В других препаратах с бензидамином его содержится слишком мало для упорки, поэтому покупаем именно розу. Бессоница может сохраняться двое суток, что только добавляет остроты ощущений. По некоторым репортам <b>может вызывать НРРД</b> <sup>14</sup> .	Релизер дофамина, М-холинолитик	Стимуляция, морфы, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия, тошнота		3	X	500	2500	5	24	Нет или неизвестно	Спирт	Без рецепта	Без рецепта	Без рецепта	?
Амантадин <i>Мидантан, ПК-Мерц</i>	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Слабый диссоциатив. Помимо диссоциации дает неприятную стимуляцию и бессоницу. В больших дозах вызывает что-то вроде стимуляторного психоза как от солей, что помноженное на диссоциацию может давать интересные глюки с открытыми глазами. Впрочем, от больших доз так же может случиться "дофаминовая яма" - очень тяжелые отхода с депрессией и апатией, длящиеся до недели и даже дольше, сравнимые с таковыми от "серотониновой ямы" после экстази. Некоторые предлагают пить при СДВГ, но эффективности примерно никакой. Возможно кардиотоксичен. <b>Внимание: диссоциативы могут вызывать НРРД и деперсонализацию-дереализацию. Диссоциативы так же не стоит мешать с депрессантами и опиоидами в больших количествах, так как это может угнетать дыхание и вызывать сильную рвоту.</b>	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, морфы, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота	ГАМКИ или опиаты в больших дозах, ГНВ	4	1	300	2000	12	24	Слабая		Средне	?	?	?
Римантадин <i>Ремантадин</i>	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Еще более слабый диссоциатив. В целом похоже на мидантан, но значительно токсичнее. Трип можно не заметить за крайне мерзкими побочками вроде звона в ушах, раскаляющейся головы, и ощущений сравнимых с лихорадкой от болезни или сильным отравлением. Легкодоступное, но совершенно школьное вещество, больше смахивающее на токсикоманию.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, морфы, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота, шум в ушах, головная боль	ГАМКИ или опиаты в больших дозах, ГНВ	1	X	250	1500	12	24	Слабая		Без рецепта	?	Без рецепта	?
Мемантин <i>Мемантал</i>	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Относительно чистый сильный диссоциатив. Дает холодную и очень долгую (до трех суток) диссоциацию. В некоторых репортах пишут что упарывались даже до k-hole, хотя информация сомнительна, так как из-за стимуляции совсем вырубиться не получается. Некоторые сравнивают пиковое действие мемантина (длящееся 6-10 часов) с РСР или кетамин. Следующие пару дней как правило не дает ничего кроме легкого дисса с вертолетами и легкостью в теле. В больших дозах может давать дофаминовые побочки как у мидантана, с его стимуляторной шизой, и неприятные отхода. Каннабиноиды и психоделики значительно усиливают визуальные эффекты, но такое сочетание может приводить к психозам. Аналогично для сочетаний с психоделиками. В малых дозах (20-40 мг) некоторыми используется как что-то типа стимулятора-ноотропа. Толер долгий, между трипами лучше ждать две недели. По некоторым репортам, сильные трипы на мемантине могут отменять толер к другим веществам или помогать от зависимости, на какое-то время делая системное употребление некайфовым.	NMDA антагонист, сигма агонист, D2 агонист	Диссоциация, стимуляция	Бессоница, тахикардия, задержка мочи, головокружение, запор, сужение зрачков	ГАМКИ или опиаты в больших дозах, ГНВ	5	2	30	200	18	50	Слабая		Средне	Трудно	Легко	?
Декстрометорфан <i>Каффетин Колд, Тофф+; ВУ: Фармавек; UA: Миллистан Мультисимптомный, Цетло+</i>	Диссоциатив	Морфинан 	Каноничный диссоциатив. Одно из лучших веществ в аптеке, описывать можно бесконечно, курите DXM FAQ. В целом отличается от других диссов своей теплотой, в малых дозах имеет эффект снотворный скорее с эйфоретиками. В больших дозах дает красивую диссоциацию без лишней психозной шизы. Эра сиролов ушла, теперь добывается либо из таблеток с псевдозфедрин (подходят только для низких плато), либо из таблеток с фенилэфрином (который отбивается плохо и может давать сильные побочки). При этом чистый DXM находится в списках и за его ввоз будет бутылка. В других странах попроще, и может быть нужна только отбивка от парацетамола холодной водой. Грейпфрутовый сок (ингибитор фермента CYP3A4) усиливает эффект. Помимо того метаболизируется CYP2D6. Прием с другими серотонинэргическими препаратами почти гарантированно вызывает серотониновый синдром.	NMDA антагонист, ИОЗ серотонина, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция, эмпатия, эйфория, улучшение восприятия музыки	Задержка мочи, тахикардия, головокружение, тошнота, расширение зрачков, чесотка	Трава, психоделики, мускат, ГАМКИ или опиаты в больших дозах, ГНВ, нефопам, сибутрамин, СИОЗС, МДМА, ИМАО, трамадол, тапентандол, 5-НТР	7	X	100	1000	8	12	Слабая	КЩЭ + сода, холодная вода	Средне	Средне	Без рецепта	?
Флупиртин <i>Катадолон</i>	Диссоциатив, Депрессант	? 	Когда-то популярный препарат, ныне лицензия на выпуск отозвана, но в списке не входит и можно найти индийские аналоги. Действие странное, но вроде как похоже на низкие плато DXM с примесью мажущего эйфоричного эффекта схожего с ГАМками, обусловлено непрямым действием на NMDA и ГАМК-А рецепторы. Действует совсем недолго. Гепатотоксичен, особенно в сочетании с алкоголем, который его разгоняет.	Активатор калиевых ионных каналов	Эйфория, диссоциация, седация, дисингибция	Тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит, задержка мочи		4	X	300	900	1	2	Слабая		Нет в аптеках	?	?	?
Нефопам <i>Акупан; UA: Нефам</i>	Диссоциатив, Стимулятор	? 	Еще один слабый атипичный диссоциатив с непрямым действием на передачу глутамата. Помимо этого имеет эффект похожий на антидепрессанты, отбивает аппетит и дает неприятную (хотя некоторым нравится) стимуляцию с тошнотой (в основном на входе) и низуевым разгоном сердца, особенно при физической активности. В целом несколько похоже на первое плато DXM, но менее эйфорично. Подходит для того чтобы полежать позалипать в полетные визуалы и объемную музыку, но можно и погулять и подвигаться если сердце не шалит. Визуальные эффекты усиливаются в сочетаниях с другими диссоциативами. Некоторых не прогирает даже в больших дозах, и действует скорее просто как стимулятор типа сибутрамина. Кардиотоксичность и сущаяки могут быть обусловлены схожестью молекулы с димедролом. Широко стоит намного дороже таблеток, но в/м биодоступность раз в пять выше. В аптеках бывает редко, хотя препарат не то чтобы дохля рецептурен. Инъекционные формы как правило добыть проще.	Блокатор кальциевых ионных каналов, ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик	Стимуляция, диссоциация, улучшение восприятия музыки, понижение аппетита, эйфория	Тошнота, тахикардия, аритмия, бессоница, сухость во рту, расширение зрачков, задержка мочи	Габалентин, трава, мускат, СИОЗС, трамадол, тапентандол, сибутрамин, DXM, МДМА, ИМАО, 5-НТР	4	X	60	180	8	14	Слабая		Средне	?	?	?
Преноксидазин <i>Либексин</i>	Диссоциатив	? 	Действие непонятное. Дает слабую диссоциацию, яркие воспоминания, аудиторные галлюцинации, трейсеры. Сильные побочки (в основном на пищеварение) уровня токсикомании, за которыми можно и пропустить трип.	Сигма агонист	Диссоциация, седация, галлюцинации	Сухость во рту, тошнота, боль в желудке		1	X	500	1000	4	8	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Тилетамин <i>Золетил, Телазол</i>	Диссоциатив	Арилциклогексиламин 	Диссоциативный анестетик из той же группы что кетамин. Продается в виде ветеринарного комбинированного препарата, в который входит еще и короткодействующий транквилизатор, ломающий диссоциативный кайф. Здесь приведены в/м дозировки тилетамина, по кишке нужно в пять раз больше, но и действие будет 7-13 часов. Проблема только в том, что закинуться по кишке без отбивки не выйдет, так как получится передоз транком. Инфы мало, способ отбивки существует только в теории. Стоит дорого.	NMDA антагонист	Диссоциация	Головокружение, задержка мочи, судороги		4	X	2,5	20	2	5	Слабая		Вет аптека	?	Вет аптека	?










Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг		Время действия, ч		Зависимость <sup>9</sup>	Отбивка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>					
									?	X	?	?			?	?	RU	BY	UA	KZ
Перампанел Файкопла	Диссоциатив		Малоизвестный препарат от эпилепсии, в аптеках бывает редко, брать под заказ. Потенциально в больших дозах может давать эйфорию и диссоциацию. А может и не давать. У зарубежных ковбоев есть репорты сравнивающие его с низкой дозой кетамина принятой перорально, но у нас пока никем не опробован по причине очень высокой цены. Метаболизируется CYP3A4, выводится долго, так что и прет возможно тоже долго. Вероятно токсичен.	AMPA антагонист	?	Головокружение, сонливость, тошнота, токсический гепатит		?	X	24	32	?	?	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?		
Эфавиренз Регаст; ВУ: Эфавир	Психоделик	Бензоказин 	Лекарство от ВИЧ, найти непросто, брать под заказ. Имеет известность среди южноафриканских торчей. Атипичный психоделик очень короткого действия, по действию больше всего напоминает сильную накурку. Инфы о применении у наших ковбоев мало. Впирает мощно, отпускает быстро, отхода тяжелые. С открытыми глазами особо не визуалит, с закрытыми есть немного психоделических картинок. Кроме того есть интересные эффекты с нарушением перспективы. В ночь после трипа вызывает очень реалистичные сновидения. Прием с жирной пищей значительно повышает биодоступность. Прием с антидепрессантами значительно повышает шансы отхехать. Таблетки реласта замедленного действия, их нужно разгрызать чтобы ускорить высвобождение. Негры умудряются даже курить свои таблетки, но делать этого не рекомендуется, по причине содержания в них потенциально токсичных вспомогательных веществ. Индуктор ферментов CYP2B6 и CYP3A4. Гепатотоксичен, на следующее утро печень и поджелудочная чувствуют себя как после пузыря водки. Толер сохраняется дольше недели. <b>Внимание: психоделики могут вызывать HPPD.</b>	Агонист 5-HT 2A, ГАМК А модулятор, ИОЗ серотонина и дофамина	Психоделия, красочные сновидения, стимуляция, седация, эйфория, улучшение восприятия музыки	Головокружение, головная боль, тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит, тахикардия, бессонница	Мускат, нефопам, сибутрамин, СИОЗС, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	5	X	600	1800	1	4	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?		
Глауцин Бронхолитин, Бронхатон; ВУ: Глауент, UA: Бронхолитин Таб	Психоделик	Апорфин 	Второй компонент сиропов с эфедрином. Вещество из той же химической группы что и алкалоиды голубого лотоса. Понижает давление, частично снимает побочки эфедрина. Вызывает обострение чувств и, в больших дозах, видения с закрытыми глазами. И по-видимому из-за него под бронхолитином так приятно дышать. Особо сильно не упорешься, так как способ разделения с эфедрином неизвестен, хотя пробовавшие чистый белорусский Глауент (которого в последнее время уже нет в продаже) говорят что на высоких дозах все равно ничего интересного нет и полноценной психоделии с него не получить. Пишут что является ингибитором MAO-A, но вероятно это пиздец.	Агонист 5-HT 2A, альфа адренорецептор, D1 антагонист	Эйфория, седация, психоделия, морфы, эмпатия, улучшение восприятия музыки	Расширение зрачков, зевота, головокружение	Трава	6	X	70	205	5	7	Нет или неизвестно	Средне	?	?	Без рецепта	?	
Кодеин Пентанов, Терпинкод, Нурофен; UA: Паракод	Опиоид	Морфинан 	Каноничный аптечный опиат. Относительно слабый, в сравнении с другой опиухой. В организме метаболизируется в морфин через CYP2D6. Сейчас найти его в аптеках уже нереально, доставать в шопак. Таблетки комбинированных препаратов как правило нужно отбивать, так как в них парацетамол. <b>Внимание: смешивание опиоидов с ГАМК-депрессантами усиливает седативный эффект. Опиоидные передозы могут быть смертельными, при экспериментах с большими дозами желателно иметь трип-ситтера и налоксон. Опиоиды вызывают сильную зависимость.</b>	Мю агонист, дельта агонист, каппа агонист	Эйфория, седация, гипнагогия	Запор, чесотка, сужение зрачков, тошнота	ГАМКи в больших дозах, ГНВ	5	X	50	300	4	6	Сильная	КЩЭ, холодная вода	ПКУ	?	?	Трудно	?
Трамadol Трамал, Залдиар	Опиоид	Фенилпропиламин 	Опиоидный анальгетик с антидепрессивными свойствами, для тех кому не хватает теплоты и комфорта в этой жизни. На малых дозах больше стимуляции, на больших седация. Нельзя мешать с релизерами серотонина, во избежание серотонинового синдрома. Ретард версию нужно мелко крошить или разжевывать. Метаболизируется в активный метаболит через CYP2D6 и в неактивные через CYP3A4, так что возможно усиливается грейпфрутом. У людей с эпилепсией и при одновременном приеме нейролептиков может вызывать судороги.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, седация, стимуляция, гипнагогия	Запор, чесотка, сужение зрачков, тошнота	Габалентиноиды в малых дозах, мускат, нефопам, сибутрамин, СИОЗС, ГАМКи в больших дозах, нейролептики, ГНВ, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	6	X	100	400	4	8	Сильная	ПКУ	Списки	?	?	?	
Талентадол Палексия	Опиоид	Фенилпропиламин 	Тоже опиоидный анальгетик, очень похожий на трамadol, только намного мощнее и приятнее - меньше антидепрессантных эффектов и больше опийных, из-за чего на него подсесть не просто легко, а очень легко. Можно толочь и нюхать, но сильно жжет нос. Кросс-толер с трамadolом. Толер спадает за две недели. Лучшее из оставшихся медленных кайфов, но вероятно в скором времени попадет в списки и доставать уже стало очень проблематично.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, седация, стимуляция, гипнагогия	Запор, чесотка, сужение зрачков, тошнота	Габалентиноиды в малых дозах, мускат, нефопам, сибутрамин, СИОЗС, ГАМКи в больших дозах, нейролептики, ГНВ, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	7	X	50	200	4	8	Очень сильная	ПКУ	?	?	?	?	
Тримебутин Тримедат, Необутин; UA: Тримспа	Опиоид, Делириант	?	Панacea от опийных запоров, если принимать в терапевтических дозах, хотя и сам дает слабые опиатоподобные эффекты в дозах уже больших, но в основном просто расслабляет и дает неприятные эффекты аналогичные холиногону. К употреблению не рекомендуется, возможно токсичен при частом приеме.	Мю агонист, М-холинолитик	Седация, овоочное состояние, морфы, галлюцинации	Тошнота, сонливость		1	3	1000	2000	3	5	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?	?	
Лоперамид Имодиум	Опиоид	?	Вместе с АПФ-ингибиторами или хинидином проходит через ГЭБ, иначе не проходит. Швепсом запивать после употребления, пить литр потихоньку на протяжении 2-3 часов. Дает слабые долгие опиатоподобные эффекты, но больше в сторону расслабления и тупяков чем эйфории. В таких дозах может вызывать смертельные нарушения сердечного ритма, поэтому к употреблению не рекомендуется. Снимает ломку от медленных.	Мю агонист	Седация	Запор, сонливость, гипотензия, аритмия		1	3	40	80	10	48	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	Без рецепта	?	
Тафалгин	Опиоид	?	Незапрещенный, в смысле не требующий строгого рецепта, опиухый обезбол. Никем не протестирован, по той причине что десять ампул этой шняги стоит как месячный запас мурого. Очень редкая штука, брать под заказ.	Мю агонист	?	?		?	?	?	?	?	?	Нет или неизвестно	Трудно	Нет в аптеках	?	?	?	





Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг		Время действия, ч		Зависимость <sup>9</sup>	Отбивка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>			
									RU	BY	UA	KZ						
Прегабалин  <i>Лирика</i> ; <i>UA: Габана, Неогабин, Зоник</i>	Депрессант, Диссоциатив	 Габалентиноид	Кайф в капсулах. Лучшее из ГАМКов и эталон аптечного кайфожорства. Имеет непрямо́й эффект, цепляющий помимо ГАМК еще и NMDA. Есть так же мнение что может связываться с опиоидными рецепторами, так как иногда используется для снятия опиатных ломок, но подтверждения этому нет. Покупать на площадках, так как в аптеках сейчас добыть почти нереально. Брать желательную оригинальную от Пфайзер/Виатрис или от Рихтер, в капсулах, так как с нестандартными пачками и дозировками можно наткнуться на хуй пойми что, скорее всего смесь габы с баклой. Все габалентиноиды вызывают привыкание, не стоит принимать их чаще 1-2 раз в неделю во избежание зависимости. Хотя некоторые их микродозят как средство от тревоги, несмотря на слабый эффект и быстро развивающийся толер. Толер от однократного приема в торчевой дозе скодит до нуля примерно за неделю, от многократного за две-три. Габалентиноиды выводятся с мочой в неизменном виде. <b>Внимание: смешивание разных групп депрессантов (включая алкоголь, бутират) между собой или с опиатами усиливает эффект, и может привести к передозу с комой, заклебыванию собственной блевотой или остановке дыхания.</b>	Блокатор потенциал-зависимых кальциевых ионных каналов	Эйфория, седация, дисингибция, стимуляция, эмпатия, морфы, диссоциация, улучшение восприятия музыки, уменьшение тревоги	Сонливость, головокружение, отеки, судороги	Трава, баклофен или фенибут в малых дозах, ГАМКи и опиаты в больших дозах, GHB	7	3	150	900	9	17	Сильная	ПКУ	?	Трудно	?
Габалентин  <i>Нейронтин, Катзна, Габагамма, Тебантин, Конвалис</i> ; <i>UA: Габалтин, Нейралгин, Медитан</i>	Депрессант, Диссоциатив	 Габалентиноид	ГАМК депрессант непрямого действия, наподобие лирики, но в целом намного слабее. Дает немного эйфории и красочные видения с закрытыми глазами, похожие на таковые от диссоциативов, но более детальные и яркие. В больших дозах есть так же глюки с открытыми глазами, но визуалит габалентин не всех. Для максимальной биодоступности пить по одной пилюле раз в полчаса-час, заедать жирным, запивать кислым, некоторые так же советуют пить леперамид для замедления прохождения по кишечнику. Большие дозы, выпитые разом, просто не усваиваются. Эстетика особенно ценится нейронтин, габатамма с катзаной и конвалисом находятся в средней ценовой категории, а канон с пиффармой и северной звездой это бюджетные варианты. Самая легкая отмена из габалентиноидов, но лучше с этим все равно не играть, так как не забываем про киндлинг. Есть исследования говорящие о высокой токсичности, у системщиков могут быть проблемы с отеками.	Блокатор потенциал-зависимых кальциевых ионных каналов	Седация, дисингибция, диссоциация, эйфория, эмпатия, улучшение восприятия музыки, морфы, уменьшение тревоги	Сонливость, головокружение, боль в почках, отеки, судороги	Трава, баклофен или фенибут в малых дозах, трамадол или палексия в малых дозах, алкоголь, ГАМКи и опиаты в больших дозах, GHB	6	2	300	3000	6	10	Сильная	Трудно	?	Средне	?
Баклофен  <i>Баклосан</i>	Депрессант	 Габалентиноид	Классика ГАМКов. Больше стимулирует и раскрепощает, меньше мажет и визуалит. Хорошо подходит для социалдства, но у некоторых может вызывать агрессию, так же как ее вызывает у некоторых алкоголь. Алкоголь, но в таблетках - часто встречающееся описание эффектов баклофена. После употребления нужно подождать три часа пока препарат усвоится, и ни в коем случае не догоняться. <b>Передозы могут приводить к коме.</b> Миксы с другими депрессантами в лучшем случае приведут к сильной блевоте, в худшем смертельно опасны, поэтому если комбинировать то только в минимальных дозах. В больших дозах вызывает рвоту и сам по себе, да и в малых тоже может вызвать противную тошноту. Можно нюхать, но тошноту это не убирает, и втирает все равно далеко не сразу. Кросс-толер с фенибутом. Тяжелые отхода, быстро развивающаяся толерантность, самая тяжелая отмена из габалентиноидов. В последнее время много жалоб но то, что попадаются нечестные колеса, возможно с некоторыми партиями выпущенными после 2023 года что-то не так.	ГАМК-Б агонист, блокатор потенциал-зависимых кальциевых ионных каналов	Дисингибция, седация, стимуляция, эйфория, эмпатия, уменьшение тревоги, улучшение восприятия музыки, красочные сновидения	Тошнота, сонливость, боль в почках, судороги	Трава, прегабалин или габалентин в малых дозах, алкоголь, DXM, мемантин, ГАМКи и опиаты в больших дозах, GHB	6	2	25	125	8	14	Очень сильная	Трудно	?	?	?
Фенибут  <i>Анвифен, Ноофен, Стоп Стресс</i> ; <i>UA: Бифрен, Нообут, Ноотрофен</i>	Депрессант	 Габалентиноид	Младший брат баклосана. Более эйфоричен и более похож на габу/лирику, но в целом слабее. На некоторых действует в малых дозах, некоторым нужно жрать огромные чтобы вперло хоть как-то, из-за чего долгое время ошибочно считался нечестным плацебо. Так же как и баклофен, усваивается примерно через три часа. В ветаптеках продается под названием Стоп Стресс. Лучшим производителем считается Олайнфарм, но эти колеса будут стоить в четыре раза дороже, если вы их вообще найдете, поэтому проще взять вполне неплохой Белмед, ну или довольствоваться бюджетным российским. Анвифен и Ноофен в капсулах и не так раздражают желудок, язвенникам пить их, ну или толочь таблетки и фасовать по пустым капсулам. Длительное употребление таблеток может быть опасно из-за повышения кислотности желудка. Впрочем, длительно употреблять особо смысла нет, так как толерантность развивается очень быстро. Кросс-толер с баклофеном.	ГАМК-Б агонист, блокатор потенциал-зависимых кальциевых ионных каналов	Эйфория, эмпатия, дисингибция, седация, уменьшение тревоги, улучшение восприятия музыки, красочные сновидения	Тошнота, боль в желудке, сонливость	Трава, алкоголь в малых дозах, прегабалин или габалентин в малых дозах, ГАМКи и опиаты в больших дозах, GHB	5	2	500	3500	6	10	Сильная	Средне	Без рецепта	Легко	?
Гопантевоная кислота  <i>Гопантам, Пантогам</i> ; <i>UA: Козуни</i> ; <i>BY: Пантокальцин</i>	Депрессант	 Габалентиноид	Какой-то дальний родственник фенибута и баклофена. Втирает относительно быстро, действие ощущается уже через час, но действует недолго. По эффектам перекоз больше в сторону стимуляции чем эйфории, хотя есть и седация с тупняками, больше всего похоже на баклу. Визуалов нет. По некоторым исследованиям токсичен, но по ощущениям побочек даже меньше чем у баклофена и фенибута. Как и фенибут, действует не на всех, и по сравнению с другими ГАМКами довольно слабо.	ГАМК-Б агонист	Стимуляция, седация, дисингибция, эйфория, уменьшение тревоги	Сонливость, тошнота, нарушения метаболизма		4	1	1000	?	4	6	Сильная	Легко	Легко	?	?
Толперизон  <i>Мидокалм</i>	Депрессант	 ?	Миорелаксант, с молекулой похжей на меф, но по эффекту похоже скорее на нормотимики чем на ГАМКи или феники. В больших дозах предположительно действует как холинота. Инфы о использовании мало. В инструкции пишут не комбинировать с некоторыми другими препаратами. Принимать после еды, натошак биодоступность ниже. А лучше вообще не принимать.	Блокатор потенциал-зависимых натриевых и кальциевых ионных каналов, Н-холинолитик	Седация, овоочное состояние	Тошнота, нарушения головокругения, головная боль, сухость во рту, судороги	СИОЗС, DXM, атомоксетин	1	X	300	?	5	8	Нет или неизвестно	Средне	?	?	?
Зопиклон  <i>Сомнол, Имован</i> ; <i>BY: Сонекс</i>	Депрессант, Галлюциноген	 Циклопирралон	Снотворное с эффектом, похожим на эффект мухоморов, только без нейротоксичности. Как и другие Z-drugs, пожалуй лучшие из доступных снотворных, несмотря на быстро набивающийся от них толер. Сильный галлюциноген, но без мерзких эффектов присущих холиноговну. Дает состояние похожее на сон наяву, действует очень долго. Таблетки толочь и нюхать. Прием внутрь не вызывает таких мощных эффектов, и может сопровождаться неприятными побочками вроде горечи во рту. В больших дозах напрочь отрубает память, можно натворить хуйни и очнуться без единого воспоминания о содеянном.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, морфы, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	ГАМКи и опиаты в больших дозах, алкоголь, GHB	4	6	7,5	15	9	50	Сильная	ПКУ	Трудно	?	?

Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг		Время действия, ч		Зависимость <sup>9</sup>	Отбивка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>				
									RU	BY	UA	KZ							
Залеплон <i>Соната Адамед, Анданте</i>	Депрессант, Галлюциноген	 Пиразолонпиримидин	Как зопиклон, только с очень коротким действием и мощнее. То же по отношению к мухоморам, что DMT по отношению к псилоцибам. Несмотря на то что препарат не в списках, добыть его сейчас практически невозможно.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, морфы, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	ГАМКи и опиаты в больших дозах, алкоголь, GHB	4	6	10	60	1	2	Сильная	Трудно	?	?	?	
Золпидем <i>Санвал, Нитрест</i>	Депрессант, Галлюциноген	 Имидазопиридин	Тот самый Эмбиен. Еще один Z-препарат, тоже мощный сонник с дикой помесью делириантных, психоделических и диссоциативных эффектов, но со средним временем действия. Он вроде как зарегистрирован, но на деле достать мало у кого получалось, в основном через площадки.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, морфы, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	ГАМКи и опиаты в больших дозах, алкоголь, GHB	4	6	10	50	5	15	Сильная	Список III	Списки	?	?	
Алпрозолам <i>Ксанакс, Золомакс</i>	Депрессант	 Бензодиазепин	Мощный транквилизатор и анксиолитик. Достать было тяжело даже в лучшие времена, сейчас и подавно. Заказ по почте чреват сгуйой. Внимание: не нужно пытаться поторчать на бензодиазепинах, они не для кайфа, а для сна, уменьшения тревоги. Торчку особенно полезны, так как по сути это лучшие средства для снятия с бздов, паничек, стимуляторных передозов и психозов, серотонинового синдрома. Передозы бензов могут приводить к неконтролируемому поведению с последующей амнезией. Синдром отмены от бензов может быть смертелен.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги, эйфория	Сонливость	Трава, ГАМКи и опиаты в больших дозах, алкоголь, GHB	3	7	0,25	1,5	5	8	Очень сильная	Список III	?	?	?	
Диазепам <i>Реланиум, Валиум, Сибазон</i>	Депрессант	 Бензодиазепин	Типичный бенз. Действует значительно дольше алпрозолама и обладает так же более сильными противосудорожными и снотворными свойствами, но не дает эйфории.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	ГАМКи и опиаты в больших дозах, алкоголь, GHB	X	7	5	15	16	44	Очень сильная	Список III	Списки	?	?	
Феназепам	Депрессант	 Бензодиазепин	Советский ксанакс. Когда-то был доступен, но сейчас хуй достанешь. Покупать на площадках, и в отличие от других бензов бутылка может даже не достигнет твой анус на почте. Валентковский феназепам весьма хренового качества, а возможно и вообще содержит какой-то другой бенз, но к сожалению продают сейчас в основном его. Есть мнение что его надо жрать в гораздо больших дозах чем старый советский, чтобы хоть как-то подействовало.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	ГАМКи и опиаты в больших дозах, алкоголь, GHB	X	5	0,5	10	15	24	Очень сильная	ПКУ	?	?	?	
Клоназепам <i>Клонопин</i>	Депрессант	 Бензодиазепин	И еще один бенз. Аналогично алпрозоламу, так же иногда используется для достижения эйфории.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги, эйфория	Сонливость	Трава, ГАМКи и опиаты в больших дозах, алкоголь, GHB	3	7	0,5	2	8	12	Очень сильная	Список III	Списки	?	?	
Гидазепам <i>Диамидазепам</i>	Депрессант	 Бензодиазепин	Слабый бенз долгого действия, доступный в украинских аптеках. Стоит недорого. Когда-то производился и в РФ, но теперь отсутствует, заказывать из Украины сейчас понятное дело не стоит.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	ГАМКи и опиаты в больших дозах, алкоголь, GHB	X	4	250	500	40	52	Очень сильная	Нет в аптеках	?	Средне	?	
Тофизопам <i>Грандаксин</i>	Депрессант	 Бензодиазепин	Атипичный бенз, со слабыми невыраженными эффектами. Есть мнение что эффекты можно списать на плацебо. Зато можно достать.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X	1	50	250	6	8	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?	
Золазепам <i>Золетил, Телазол</i>	Депрессант	 Пиразолондиазепинон	Второй компонент собачьего ширева из ветаптек, что-то навряде бензов. Учитывая что компонентов в лекарстве поровну, а дозировки при пероральном употреблении у бенза гораздо ниже чем у диссоциатива (тяжелая доза золазепама 20 мг перорально, 20 мг тилетамина по кишке это легкая доза), вероятно можно применять как анксиолитик игнорируя слабые диссовые эффекты. По ноздре золазепама нужно почти в два раза меньше (в отличие от бензов он водорастворим и усваивается таким образом), но тогда тяжелая доза золазепама в 12 мг будет соответствовать тяжелой же дозе тилетамина в 12 мг. Проверенного способа отбивки нет.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X	4	2,5	20	5	12	Очень сильная	Вет аптека	?	Вет аптека	?	
Фенобарбитал <i>Валокордин, Корвалол, Беллатаминал; UA: Барбовал</i>	Депрессант	 Барбитурат	Наркотик для бабушек и звезд прошлого. Транквилизатор и анксиолитик, но в целом хуже чем бензы. Зато по доступной цене и отпускают без проблем. Желательно отбивать, потому что злоупотребление неотбитым ведет к накоплению брома в организме. Так же есть в таблетках Беллатаминал с привкусом холиноговна и спорыньи, но их найти труднее. Действует долго, поэтому при использовании в качестве снотворного на утро будет тяжесть. Зависимость от барбитуратов такая же как от бензодиазепинов, а возможно и хуже. Индуктор CYP ферментов.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	ГАМКи и опиаты в больших дозах	X	3	50	300	12	48	Очень сильная	Выпаривание	Без рецепта	Без рецепта	Без рецепта	Без рецепта
Этифоксин <i>Стрезам</i>	Депрессант	 ?	Как бы анксиолитик, но действие очень слабое. Еще что-то там делает с синтезом нейростероидов, возможно будет интересно любителям ноотропов.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X	1	50	200	6	8	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?	

Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг		Время действия, ч		Зависимость <sup>9</sup>	Отбивка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>			
									RU	BY	UA	KZ						
Кариспродол <i>Каризпродол, Сом</i>	Депрессант	 Карбамат	Транквилизатор и миорелаксант, хотя в отличие от большинства бензос им хоть как-то можно упорядочить, однако делать этого все равно не рекомендуется, так как кайф весьма сомнительный, а зависимость столь же сильная как от бензос и барбитуры. Заказывать у индусов. Теоретически могут посчитать производным нелегального мепробамата, но о кейсах с бутылкой никто еще не слышал.	ГАМК-А модулятор, ИОЗ аденозина	Седация, уменьшение тревоги, дисингибция, эйфория	Сонливость	ГАМКи и опиаты в больших дозах	3	4	350	700	3	6	Очень сильная	Нет в аптеках	?	?	?
Карбамазепин <i>Финлепсин</i>	Депрессант		Нормотимик. Дает неприятное оwoчное расслабленное состояние. Индуктор CYP ферментов. <b>Внимание: не нужно пытаться торчать на нормотимиках, они для bipolarников. Нормотимики сильно токсичны, большие дозы могут быть опасны. Сочетание нормотимиков с серотонинэргическими препаратами может приводить к серотониновому синдрому.</b>	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, оwoчное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит	СИОЗС	X	1	200	400	12	24	Нет или неизвестно	Средне	?	?	?
Ламотриджин <i>Ламиктал, Сейзар</i>	Депрессант	 Фенилтриазин	Еще один нормотимик, послабее карбамазепина, и вроде как с менее выраженными побочками, но все так же токсичен.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, оwoчное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит	СИОЗС	X	2	?	?	?	?	Нет или неизвестно	Средне	?	?	?
Тизанидин <i>Сирдалуд, Тизалуд</i>	Депрессант	 Имидазолин	Гипотензивное типа клофелина. Очень сильно понижает давление, дает оwoчную расслабленность. Вроде бы как возможны легкие галлюцинации, но возможно это от гипоксии мозга. Гепатотоксичен.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, оwoчное состояние	Сонливость, брадикардия, гипотензия		X	2	2	8	2	5	Слабая	Легко	?	?	?
Ксилазин <i>Ксила</i>	Депрессант		Еще одно анестетическое ширево для ветеринарии. Гипотензивное, по эффектам аналогичен клофелину и тизанидину. Токсичен. При инъекционном употреблении можно стгнуть заживо прям как от крокодила, ня.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, оwoчное состояние	Сонливость, брадикардия, гипотензия, тошнота		X	1	?	?	?	?	Слабая	Вет аптека			
Фаботомитзол <i>Афобазол</i>	Депрессант		Вроде бы анксиолитик, но на деле скорее всего пустышка как и грандаксин. Может быть можно использовать как снотворное. Так же в некоторых исследованиях пишут про ингибирующие свойства в отношении MAO.	Агонист мелатониновых рецепторов, сигма агонист, ингибитор MAO-A	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость, головная боль		X	1	?	?	2	3	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?
Винпоцетин <i>Кавинтон</i>	Депрессант, Диссоциатив		Какой-то ноотроп, с весьма подозрительным механизмом действия, наводящем на мысли о диссоциативных свойствах. Свойств этих, впрочем, замечено не было, из эффектов присутствует только тупняковая расслабленность, неприятные ощущения в груди, и какое-то необычное усиление звуков. Не так противно как толперизон и нормотимики, но что-то из той же оперы.	NMDA и AMPA антагонист, блокатор кальциевых и натриевых ионных каналов	Седация, оwoчное состояние	Головокружение, сонливость, тахикардия, аритмия		1	X	30	?	4	8	Нет или неизвестно	Легко	?	?	?
Топирамат	Депрессант		Противоэпилептический препарат с кучей интересных психических побочек, но инфы о применении пока нет. Не психических побочек впрочем тоже хватает, вероятно токсичен.	ГАМК-А модулятор	?	?		?	?	?	?	?	?	Нет или неизвестно	Средне	?	?	?
Эмоксипин <i>Мексидол, Мексикар</i>	Депрессант		Вроде как ноотропное средство, для в/м введения. Хотя есть и таблетки, но они менее эффективны, видимо из-за низкой биодоступности. Сам по себе не прет, но помогает сниматься с отмены любых других ГАМКов, включая алко, габапентиноиды, и бензодиазепины. Хотя некоторые говорят что им не помогает. Также может усиливать ГАМКи при одновременном приеме (до 1000 мг перорально), и возможно даже препятствует быстрому формированию толера, но все это не точно. Вызывает сонливость, может быть кому-то подойдет как снотворное. На отмене принимать 2-3 раза в сутки <sup>15</sup> .	ГАМК модулятор, модулятор ацетилхолиновых рецепторов	Седация	Сонливость	Габапентиноиды	X	4	100	500		Принимать курсом	Нет или неизвестно	Легко	Легко	Легко	?
Идебенон <i>Набен, Новобенон</i>	Депрессант		Еще один типа ноотроп, который может помочь слезть с ГАМКов лесенкой или восстановиться после запоя (а может и не помочь). Механизм действия непонятен.			Тошнота, расстройство пищеварения		X	2	30	90		Принимать курсом	Нет или неизвестно	Легко	Легко	?	?
Валериана	Депрессант		Растение, содержащее изовалериановую кислоту. Она кислота является очень слабым ГАМК модулятором. Продается в виде таблеток с экстрактом, настойки, или порошка из измельченных корней. Производное изовалериановой кислоты присутствует в составе корвалола.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X	1	?	?	?	?	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?
Мелисса	Депрессант		Еще одна слабая гамковая травка. Содержит ингибиторы ГАМК-трансаминазы (фермента разлагающего ГАМК), возможно разгоняет нормальные ГАМКовые препараты, но это не проверено. Кроме того в ней вроде бы как присутствуют слабые неселективные ИMAO.	Ингибитор ГАМК-Т, ингибитор MAO	Седация	Сонливость, тошнота, частое мочеиспускание		X	1	?	?	?	?	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?
Арипипразол <i>Арипризол, Зилаксер; ВУ: Абизол; УА: Арлентал</i>	Нейролептик		Мощный атипичный нейролептик. Сниматься с психозов. Стоит дорого. <b>Внимание: не нужно пытаться торчать на нейролептиках, они для купирования шизы и для сна. Сочетание нейролептиков с депрессантами повышает риск передоза и комы. Сочетание с серотонинэргическими веществами может приводить к серотониновому синдрому, и даже сами по себе нейролептики вызывают у некоторых людей похожее состояние - злокачественный нейролептический синдром. Нейролептики сильно токсичны и могут вызывать серьезные нарушения метаболизма и гормонального фона.</b>	Антагонист 5-HT 2, D2	Седация, оwoчное состояние	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства		X	2	10	30	48	96	Слабая	Трудно	?	?	?
Олазапин <i>Зипрекса, Заласта</i>	Нейролептик		Туже атипичный нейролептик, для тех кого арипипразол уже не вставляет и нужно помощнее. Или для тех кому нужно подешевле. Токсичность еще выше (особенно диабетогенная, которая контрится метформином), но все же не такая сильная как у типичных нейролептиков. Возможно имеет холинолитические эффекты в больших дозах, но лучше не проверять.	Антагонист 5-HT 2, D1, D2, D3, антигистамин, M-холинблокатор, альфа-адреноблокатор	Седация, оwoчное состояние	Сонливость, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства, сухость во рту		X	2	5	20	12	54	Слабая	Трудно	?	?	?

Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг		Время действия, ч		Зависимость <sup>9</sup>	Отбивка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>				
									RU	BY	UA	KZ							
Алимемазин Тералиджен	Нейролептик		Еще один дорогой атипичный нейролептик, но помогае и с антигистаминными эффектами. Можно использовать как анксиолитик или снотворное, но лучше все-таки найти менее токсичные препараты.	Антигистамин, антагонист D2	Седация, уменьшение тревоги, овоочное состояние	Сонливость, головокружение, сухость во рту		X	2	20	80	6	12	Слабая		Трудно	?	?	?
Кветиапин Сероквель, Кетилепт; UA: Кветирон, Кветиксол	Нейролептик		Более доступный щадящий атипичный нейролептик. Используется как неплохое снотворное (в дозах 25-50 мг), и как овощащее успокоительное, но можно и сниматься с дофаминовых психозов. Злоупотреблять однако не стоит, есть менее токсичные снотворные. Есть репорты, что дает яркие красочные сны при приеме на ночь.	Антигистамин, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2, D1, D2	Седация, уменьшение тревоги, овоочное состояние, красочные сновидения	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства		X	2	25	300	7	20	Слабая		Трудно	?	Средне	?
Сульпирид Элонил	Нейролептик		Нейролептик, якобы с антидепрессивным и стимулирующим эффектом. Противорвотное.	Антагонист 5-HT 2, D2, D3		Бессонница, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства		X	1	200	800	4	8	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Метоклопрамид Церукал	Нейролептик		Противорвотное. Вроде как можно использовать в качестве легкодоступного нейролептика.	Антагонист D2		Расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства		X	1	?	?	3	6	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?
Флуоксетин Прозак	Антидепрессант		Самый доступный из антидепрессантов. Хотя в целом антидепрессанты не то чтобы доступны нынче - из-за отдельного приказа минздрава по ним, доставать их тяжелее чем многие торчевые препараты. Принимать курсом, как и все СИОЗС. Как очевидно из названия группы, лечит депрессию. Вызывает неприятную стимуляцию и ажитацию. Внимание: сочетание разных групп антидепрессантов между собой или с некоторыми другими серотонинергическими веществами (MDMA, DXM, трамадол, 5-НТР, и прочие) приводит к тяжелому серотониновому синдрому, возможен летальный исход. Антидепрессанты могут парадоксально усиливать суицидальные мысли.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, снижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, талентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-НТР	X	3	20	60	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Пароксетин Паксил	Антидепрессант		Примерно то же что и флуоксетин, но помощнее и еще и со слабыми антигистаминными эффектами.	СИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин	Стимуляция, мания	Бессонница, снижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-НТР	X	4	20	60	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Сертралин Золофт	Антидепрессант		Еще одно вещество из той же группы что флуоксетин с пароксетином, но немного поприятнее и с менее жесткой отменой.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, снижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-НТР	X	4	50	200	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Флувоксамин Феварин	Антидепрессант		И еще один аналог флуоксетина. Есть мнение что он может переть и давать недолгую эйфорию если рассасывать под языком.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, снижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, трамадол, талентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-НТР	X	4	50	300	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Эсциталопрам Селектра, Ципралекс	Антидепрессант		Тоже селективный ингибитор обратного захвата серотонина, отличается меньшей частотой возникновения побочек.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, снижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-НТР	X	4	10	20	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Венлафаксин Велаксин	Антидепрессант		Вроде как один из лучших имеющихся стимулирующих антидепрессантов. Ходят слухи что помимо прочего так же связывается с опиоидными рецепторами, если упарывать в больших дозах. Сильный синдром отмены, по сравнению с другими антидепами.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, снижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, талентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-НТР	X	5	75	225	Принимать курсом	Сильная		Трудно	?	?	?	
Дулоксетин Симбалта	Антидепрессант		Что-то наподобие венлафаксина, тоже один из лучших имеющихся стимулирующих антидепрессантов.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, снижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, талентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-НТР	X	5	60	120	Принимать курсом	Сильная		Трудно	?	?	?	

Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг		Время действия, ч	Зависимость <sup>9</sup>	Отбивка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>				
									RU	BY				UA	KZ			
Милнаципран <i>Иксел</i>	Антидепрессант		Тоже СИОЗСН, но в аптеках нет, заказывать как обычно у перекупов индийского.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, ДХМ, МДМА, 5-НТР	X	5	50	200	Принимать курсом	Сильная		Нет в аптеках	?	?	?
Селегелин <i>Депренил, Элдеприл</i>	Антидепрессант		Один из немногих еще доступных ИМАО. Селективен к MAO-B, но в больших дозах ингибирует и MAO-A, возможно разгоняет психоделики (но это не точно). Одним из метаболитов является левометамфетамин. Используется для лечения СДВГ. Внимание: эффект приема ИМАО может сохраняться до двух недель. В течение этого времени стоит избегать препаратов, которые могут спровоцировать серотониновый синдром.	Ингибитор MAO-B	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, диарея	Амфетамины, СИОЗС, ДХМ, МДМА, нефопам, сибутрамин, мускат, 5-НТР, трамадол, тапентадол, ТЦА	3	4	?	?	2	4	Нет или неизвестно	Нет в аптеках	Нет в аптеках	Трудно	Нет в аптеках
Разагилин <i>Азилект</i>	Антидепрессант		Еще один селективный ингибитор MAO-B. Назначается паркинсоникам, но возможно работает и для СДВГ и депрессии. Интересных метаболитов не имеет, зато имеет много побочек. В отличие от большинства других ИМАО, присутствует в аптеках, но ИРЛ достать очень проблематично как и все антидепрессанты. Ценник просто конский.	Ингибитор MAO-B	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, гипертонзия, головная боль, диарея	Амфетамины, СИОЗС, ДХМ, МДМА, нефопам, сибутрамин, мускат, 5-НТР, трамадол, тапентадол, ТЦА	X	3	?	?	?	?	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?
Транилципромин	Антидепрессант		Неселективный ИМАО. Достается у индусов, как и селегелин. Вроде как тоже метаболизируется во что-то амфетаминовое и разгоняет.	Ингибитор ИМАО, релизер дофамина	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, диарея	Амфетамины, СИОЗС, ДХМ, МДМА, нефопам, сибутрамин, мускат, 5-НТР, трамадол, тапентадол, ТЦА	3	4	?	?	2	3	Нет или неизвестно	Нет в аптеках	?	?	?
Пирлиндол <i>Пиразидол</i>	Антидепрессант		Обратимый ИМАО, селективный к MAO-A, что возможно делает его более подходящим для разгона психоделиков. Инфы о применении очень мало. Имеется в продаже, и в отличие от азилекта относительно дешевый.	Инибитор MAO-A	Стимуляция, мания	Бессонница, тахикардия, тошнота	СИОЗС, ДХМ, МДМА, нефопам, сибутрамин, мускат, 5-НТР, трамадол, тапентадол, ТЦА	X	3	?	?	2	8	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?
Амитриптилин	Антидепрессант, Делириант		Трициклический антидепрессант. Помимо собственно антидепрессивного эффекта еще и сильно овоцит. Можно упарывать как слабый холинолитик (но не нужно) или чтобы поспать (но тут смотрим на время действия, хотя в малых количествах утренней сонливости может и не быть).	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, овоочное состояние, морфы, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия	5-НТР, ИМАО	1	3	50	300	18	46	Слабая	Трудно	?	Средне	?
Кломипрамин <i>Анафранил</i>	Антидепрессант, Делириант		Еще один трициклик холинолитик для любителей спать сутками, более мощный и с большим количеством побочек.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, мания, овоочное состояние, морфы, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия, нарушения метаболизма	5-НТР, ИМАО	1	3	25	150	19	54	Слабая	Трудно	?	?	?
Имипрамин <i>Мелипрамин</i>	Антидепрессант, Делириант		И еще ТЦА, вроде бы с меньшим количеством холиновых эффектов и более стимулирующий чем овоощаций.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, мания, овоочное состояние, морфы, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия	5-НТР, ИМАО	1	4	75	250	8	24	Слабая	Трудно	?	?	?
Досулепин <i>Дотиепин</i>	Антидепрессант		Индийский ТЦА, для не таких как все. Овердозами пить не выйдет из-за сильной токсичности.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, овоочное состояние	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия, токсический гепатит	5-НТР, ИМАО	X	2	?	?	15	45	Слабая	Нет в аптеках	?	?	?
Миртазапин <i>Каликста ; ВУ: Мирзатен</i>	Антидепрессант, Галлюциноген		Тетрациклический антидепрессант, тоже несколько овоощаций. От долгого применения жиреют из-за повышенного аппетита, жрать хочется как от покура травы. Мощное спотворное, пожалуй лучшее что есть после Z-препаратов, хотя могут оставаться эффекты на утро - полностью выводится дольше суток. Дает видения с закрытыми глазами, чем-то похожие на диссовые, но более реалистичные. В больших дозах оказывает странное галлюциногенное действие, с морфингом, трейсерами и психоделической геометрией, если это все конечно не поспать. При этом когнитивные эффекты, свойственные диссам, психоте, или делириантам отсутствуют. Метаболизируется CYP1A2, CYP2D6 и CYP3A4.	Антагонист 5-НТ 2, каппа агонист, антагонист альфа-2 адренорецепторов, М-холинолитик, антигистамин	Седация, гипнагогия, морфы, галлюцинации	Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение, сужение зрачков	5-НТР, ИМАО	4	5	45	270	14	24	Слабая	Трудно	?	?	?
Миансерин <i>Миасер, Леривон</i>	Антидепрессант, Галлюциноген		Тоже тетрациклик, родственный миртазапину. Вроде должно иметь схожие эффекты, возможно не так усыпляет из-за норадреналиновой стимуляции, но инфы о применении пока нет. Есть предположения, что связывается еще и с мю рецепторами помимо каппа, и дает какие-то опиоидные эффекты, но никто не проверял. Метаболизируется CYP2D6.	Антагонист 5-НТ 2, каппа агонист, антагонист альфа адренорецепторов, ИОЗ норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, гипнагогия, морфы, галлюцинации	Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение, сужение зрачков, запор	5-НТР, ИМАО	4	5	?	?	?	?	Слабая	Трудно	?	?	?

Вещество <sup>1</sup>	Фарм группа <sup>2</sup>	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие <sup>3</sup>	Эффекты <sup>4</sup>	Побочки <sup>5</sup>	Сочетания <sup>6</sup>	☆ <sup>7</sup>	Дозы <sup>8</sup> , мг		Время действия, ч		Зависимость <sup>9</sup>	Отбывка <sup>10</sup>	Доступность <sup>11</sup>				
									RU	BY	UA	KZ							
Тразодон Триттико	Антидепрессант, Делириант	Фенилпиперазин 	Атипичный антидепрессант с необычными свойствами афродизиака. Может быть можно использовать для стояка, хотя сосуды не расширяет в отличие от йохимбина. Овощит значительно меньше чем трициклики, но все равно можно использовать как снотворное, и в этом плане он наверное даже лучше из-за короткого времени действия.	Антагонист 5-НТ 2, ИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, повышение либидо	Сонливость, аритмия, головокружение, тошнота, сухость во рту, запор	5-НТР, ИМАО	1	4	75	600	3	9	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Родиола розовая	Антидепрессант	?	Водно-спиртовой экстракт. Безрецептурен, но столь же редок в аптеках, как и то растение из которого его производят. Иногда еще можно найти в таблетках, но они дорогие, или попадаетея в виде порошка на сайтах торгующих БАДами. Содержит алкалоиды, неселективно ингибирующие моноаминоксидазу. Вероятно может разгонять психоделики, но инфы о применении мало.	Ингибитор MAO	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, гипертензия головная боль	СИОЗС, ДХМ, МДМА, сибутрамин, мускат, нефопам, трамадол, тапентадол, ТЦА, 5-НТР	X	3	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
5-Гидрокситриптофан 5-НТР	Антидепрессант	Индоламин 	Продается как биодобавка. Проходит ГЭБ и превращается в серотонин. Имеет слабый антидепрессивный эффект. В больших дозах могут быть легкие морфы и трейсеры. Некоторые пьют его в дни после приема МДМА чтобы облегчить отхода, но вообще различные сочетания опасны серотониновым синдромом.	Прекурсор серотонина	Стимуляция, седация, красочные сновидения	Изжога, тошнота, диарея, тахикардия, сонливость	СИОЗС, ТЦА, ИМАО, ДХМ, МДМА, сибутрамин, нефопам, мускат, трамадол, тапентадол	X	3	100	500	2	4	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	Без рецепта	?
L-Тирозин	Антидепрессант	Фенетиламин 	Еще одна биодобавка, на этот раз превращающаяся в дофамин. Возможно этим можно как-то облегчать стимуляторные отхода, но как оно на деле хрен его знает.	Прекурсор дофамина	Стимуляция, понижение аппетита	Головная боль, бессонница, тошнота	Амфетамины, кокаин, ИМАО	X	2	500	4000	2	4	Нет или неизвестно		Без рецепта			
Мелатонин	Антидепрессант	Индоламин 	Еще одна биодобавка. Вырабатывается в организме естественным образом, регулирует циклы сна. Биодоступность низкая, лучше рассасывать таблетки под языком. Используется как слабое снотворное, вызывает очень яркие сны.	Агонист мелатониновых рецепторов	Седация, красочные сновидения	Тошнота, головная боль		X	2	3	9	6	10	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	Без рецепта	?
Зверобой	Антидепрессант	?	Трава с очень слабыми антидепрессивными свойствами. Содержит гиперичин и гиперфорин. Ингибирует MAO и дофамин-бета-гидроксилазу, фермент превращающий дофамин в норадреналин. Индуктор ферментов СУР3А4 и СУР2С9.	Ингибитор MAO, ингибитор ДБГ	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, гипертензия расстройства пищеварения	СИОЗС, ДХМ, МДМА, сибутрамин, мускат, нефопам, трамадол, тапентадол, ТЦА, 5-НТР	X	1	?	?	3	12	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	Без рецепта	?

1) Сверху обычным шрифтом указано непатентованое наименование химического вещества. Снизу *курсивом* указаны наименования патентованных препаратов этого вещества, в том числе комбинированные. Вещество может продаваться под непатентованным, либо под одним из торговых наименований. Для препаратов, продающихся в других странах кроме России, указаны префиксы: UA - Украина, BY - Беларусь, KZ - Казахстан. Например, для DXM это значит что Каффетин Колд и Тофф+ продаются в РФ, Фармавекс продается в РБ, а Милистан и Цетло+ продаются в Украине. Цветом фона обозначено количество имеющихся сведений о торговом использовании препарата: белым - обычные препараты, о которых известно достаточно; **голубым** - классика, проверенная временем, такие препараты имеют долгую историю применения и хорошо изучены; **желтым** - странное и непроверенное, экспериментальные препараты, о которых известно достаточно мало.

2) Минутка википедического аутизма. Один препарат может принадлежать ко многим группам одновременно, но указывается одна или две, эффекты которых наиболее выражены. **Стимуляторы** увеличивают активность центральной нервной системы, способствуют психомоторному возбуждению. Один из трех основных классов психоактивных веществ наряду с депрессантами и галлюциногенами. Типичные эффекты включают уменьшение усталости и сонливости, улучшение фокуса, подавление аппетита, ускорение мышления, эйфорию. Побочные эффекты включают учащение сердцебиения, повышенное артериальное давление, повышенную температуру тела, сужение сосудов. **Антидепрессанты** являются подтипом стимуляторов, но вынесены в отдельную категорию. Эффекты антидепрессантов в целом похожи, но развиваются не сразу а по мере терапевтического приема, и эти вещества как правило представляют малый интерес с точки зрения торча. **Депрессанты** снижают активность в ЦНС, уменьшают возбуждение в различных областях мозга. Типичные эффекты включают седацию, подавление тревоги, дезингибирование, расслабление мышц и эйфорию. Побочные эффекты включают тошноту, снижение артериального давления, снижение частоты сердечных сокращений, угнетение дыхания. В высоких дозах могут вызывать полную анестезию. **Опиоиды** являются подтипом депрессантов, но вынесены в отдельную категорию. В отличие от других депрессантов, опиоиды воздействуют не на ГАМК систему, а на рецепторы эндорфинов. Типичные эффекты включают дополнительно подавление боли, подавление кашля, очень сильную эйфорию и визуалы с закрытыми глазами. Типичные побочные эффекты включают дополнительно часотку, запор, сужение зрачков. Нейролептики являются еще одним подтипом депрессантов с отдельной категорией. **Нейролептики** представляют собой класс веществ, блокирующих дофаминовые и серотониновые рецепторы в мозгу, и в основном используются для лечения психоза, особенно при шизофрении. Типичные эффекты включают седацию, замедление мышления, апатию, подавление мотивации, анализа и фокуса. Типичные побочные эффекты включают экстрапирамидные симптомы, гиперпролактинемию и другие метаболические аномалии. Галлюциногены вызывают мощные изменения в восприятии, настроении и различных когнитивных процессах. **Галлюциногены** принципиально отличаются от стимуляторов и депрессантов - вместо того, чтобы просто усилить или ослабить существующие состояния сознания, они производят качественно уникальные состояния, в которых реальность воспринимается новым образом. Конкретно здесь категория "галлюциногены" присвоена веществам, которые не относятся однозначно к одному из трех основных подтипов галлюциногенов (психоделики, диссоциативы, делирианты) и обладают эффектами всех трех. **Психоделики** являются серотонинергическими галлюциногенами, которые вызывают измененное состояние сознания, характеризующееся необычными изменениями в восприятии, настроении и когнитивных процессах. Типичные эффекты включают визуалы с открытыми и закрытыми глазами, искажение времени, усиление чувств, усиление самоанализа, концептуальное мышление, эйфорию и потерю эго. Побочные эффекты кроме расширенных зрачков являются редкими, но возможны неблагоприятные психологические реакции (тревога, бред, психоз). **Диссоциативы** - это класс галлюциногенов, который работает, блокируя NMDA рецепторы глутамата. Вещества этого класса характеризуются искаженными сенсорными восприятием и чувством отключения или отрешения от окружающей среды и себя. Феноменология часто описывается с точки зрения уменьшения или блокировки сигналов в сознательный разум из других частей центральной нервной системы. Типичные эффекты во многом похожи на психоделики, но также включают изменения в восприятии гравитации, подавление тактильных ощущений, анальгезию и, в высоких дозах, полную анестезию. Побочные эффекты также включают потерю моторного контроля, угнетение дыхания и задержку мочи. **Делирианты** представляют собой подкласс галлюциногенов, которые работают посредством антихолинергической активности. Они имеют уникальное свойство производить неотличимые от реальности галлюцинации, интегрированные в нормальное восприятие. Наиболее распространенные темы для этих галлюцинаций включают в себя повседневные случаи типа курения фантомных сигарет, разговор с людьми, которых на самом деле нет, насекомых, призраков, демонов и другие кошмары. Типичные побочные эффекты включают тахикардию, аномальный ритм сердца, гипертермию, сухость во рту, беспокойные ноги, частое мочеиспускание, сонливость, восприятие тяжести тела, амнезию, беспокойство, растерянность, паранойю и дисфорию.

3) Здесь указано только действие, приводящее к психоактивным эффектам.

4) Стимуляция - ощущение энергичности, бодрости, мотивации выполнять какие-либо задачи, желания двигаться, ускорение мыслей. Седация - ощущение расслабленности, нежелание двигаться и работать, замедление мыслей. Опьянение. Уменьшение тревоги - ослабление негативных эмоций, раздражения, страха. Эйфория - ощущение комфорта, удовлетворения, благополучия, приподнятого настроения, восторга, радости, счастья. Эмпатия - усиление чувства сопереживания и любви к другим людям, желания и способности общаться, снижение страхов связанных с социальными ситуациями. Дисингибция - склонность к импульсивному поведению и немедленному удовлетворению потребностей, ориентация на текущие мысли и внешние раздражители, подавление эмоциональной сдержанности, безрассудство, плохая оценка риска и игнорирование социальных соглашений. Гипнагогия - красочные реалистичные видения с закрытыми глазами, похожие на осознанные сны; видения от опиагов обычно называются дрёмами. Морфы - искажения зрительного восприятия, при которых поверхности и текстуры кажутся движущимися и текущими, а формы объектов произвольно гнутся и меняются. Галлюцинации - восприятие объектов, которых на самом деле не существует; могут быть зрительными, слуховыми, тактильными. Делирий - полная дезориентация, потеря способности отличать галлюцинации от реальности. Диссоциация - чувство отстраненности от реальности и самого себя, притупление тактильных ощущений и чувства своего тела, видения с закрытыми глазами (включающие полеты по тоннелям, сложные детализированные структуры, внетелесный опыт, восприятие параллельных реальностей), аудио-визуальные искажения, и другие измененные состояния сознания. Психоделия - усиление чувств, обострение восприятия, искажение восприятия времени, склонность к самоанализу и концептуальному мышлению, видения с закрытыми глазами (как правило абстрактная геометрия), и другие измененные состояния сознания. Красочные сновидения - повышение частоты возникновения сновидений, их длительности, яркости, интенсивности переживаний в них; так же повышение вероятности осознанных снов. Овощное состояние - подобно седации, но вместо приятного расслабления это просто неспособность нормально мыслить, фокусироваться, испытывать эмоции, и заниматься какой-либо деятельностью. Мания - подобно стимуляции, но вместо приятной энергичности это просто агитация, неспособность найти себе место, нервозность. Повышение либидо - усиление полового влечения. Улучшение восприятия музыки - ощущение что музыка звучит лучше, четче, объемнее, гармоничнее, приносит больше удовольствия и эмоций, чувствуется и осознается каждый звук в мелодии.

5) Тахикардия - увеличение частоты сердечных сокращений. Брадикардия - уменьшение частоты сердечных сокращений. Аритмия - все прочие нарушения сердечного ритма. Гипертензия - повышенное артериальное давление. Гипотензия - пониженное артериальное давление. Вазоконстрикция - сужение сосудов. Гипертермия - повышение температуры тела. Тяжесть - чувство того что тело стало значительно тяжелее, трудность в перемещении, усталость. Амнезия - потеря памяти, обычно невозможность вспомнить то что происходило под действием вещества. Задержка мочи - невозможность или трудность мочеиспускания. Гормональные нарушения - от нейролептиков это обычно повышение уровня пролактина. Экстрапирамидные расстройства - дрожь в конечностях, спонтанные движения. Понижение либидо - уменьшение полового влечения, невозможность возбуждения и эрекции.

6) Комбинации с другими веществами. **Зеленым** выделены хорошие, годные комбинации. **Оранжевым** обозначены потенциально опасные, нужен осторожный подход. **Красным** выделены те, от которых почти наверняка будет гроб, гроб, кладбище, пидор.

7) Рейтинг по шкале от 1 до 7, первый для торчевого применения, второй для утилитарного. Утилитарные вещества являются психотропами так же как и торчевые, но плохо подходят для приема в высоких дозах с целью получения каких-то положительных приятных эффектов. Однако, они могут полезны для снятия побочных эффектов других препаратов и лечения разного рода психических отклонений (СДВГ, депрессия, ОКР, тревога, психоз, бессонница, и прочее). Если вещество не имеет торчевой оценки, значит оно не подходит для торчевого применения, и используется только утилитарно. Аналогично, если вещество не имеет утилитарной оценки, то его психоактивные эффекты находят только торчевое применение (хотя вещество может все еще быть полезно по назначению, например от боли или от кашля). Для веществ, не имеющих торчевого или утилитарного применения, в соответствующей графе будет крестик X вместо оценки. Все оценки субъективны, и выдаются на основании моего личного опыта, опытов анонов из тредя, и трип-репортов которые могут быть найдены онлайн. Учитываются как эффекты, так и побочки и прочие особенности применения. Относитесь к оценкам торчевых веществ как к вероятности того что вам это вещество понравится (7 - выбор редакции, препараты, которые являются одними из лучших для торча в принципе; 6 - нравится большинству, выраженные эффекты, мало побочек; 5 - нравится многим; 4 - 50/50; 3 - на любителя, слабые эффекты, сильные побочки; 2 - нравится очень мало кому; 1 - лучше вообще такое никогда не трогать), к оценкам утилитарных веществ как к вероятности того что вам это вещество будет полезно для решения каких-то врожденных или возникших от употреба проблем (7 - торчку лучше всегда иметь что-то такое в домашней аптечке; 6 - определенно полезная вещь; 5 - полезно, но могло быть и посылнее, или сильный препарат при определенных проблемах; 4 - ситуативно может пригодиться, или полезно при определенных проблемах хотя есть препараты лучше; 3 - кому-то ситуативно может пригодиться, но слабые эффекты или выраженные побочки; 2 - только для узкого круга проблем, или очень сильные побочки, или есть препараты намного сильнее; 1 - практически бесполезно). Для плохо изученных препаратов рейтинги могут быть спекулятивны (обозначены более светлым шрифтом), по причине отсутствия достаточного количества репортов. Для веществ, даже предположительный потенциал которых неизвествен, вместо оценки стоит знак вопроса ? - об использовании ковбоями таких веществ, и чего бы то ни было на них похожего, совершенного ничего неизвестно, однако по механизму действия можно предположить что они психоактивны. Оценки могут меняться на основании получаемых новых данных об использовании вещества.

8) Дозировки указываются без учета толерантности, на среднего человека. Всегда нужно начинать принимать неизвестное вещество в минимальных дозах, масса тела, особенности метаболизма и чувствительность рецепторов у всех разная. Максимальные дозы могут быть опасны, особенно справедливо для делириантов, хотя у стимуляторов есть риск опасных сердечно-сосудистых побочек, а передозы депрессантов могут приводить к коме и остановке дыхания. Дозировки с высоким толером могут быть значительно больше чем указанные, поэтому не стоит удивляться если кто-то в трее пишет что упарывает конские дозы. Время действия так же может сильно меняться в зависимости от параметров организма. При тестировании комбинаций различных веществ желательно использовать минимальные дозировки.

9) Если у препарата указано "**нет или неизвестно**", это лишь значит что случаи возникновения зависимости настолько редки, что инфу о них трудно найти. **Слабая** - на препарат тяжело подсесть (в силу того что у него долго набивается и быстро падает толерантность), либо из-за неприятных эффектов не возникает желания употреблять повторно или часто, либо подсесть легко но легко и бросить (слабо выраженный синдром отмены). **Сильная** - на препарат легко подсесть и тяжело бросить, синдром отмены крайне неприятный. **Очень сильная** - на препарат легко подсесть и тяжело бросить, синдром отмены не просто неприятный, но и очень долгий (может длиться месяцами) и сопровождается рядом потенциально опасных симптомов психического (делирий, психоз, суицидальные мысли) и физического (нарушения сердечного ритма, сильные судороги) характера. Любая из категорий может быть присвоена веществу, на которое возможно никто и не подсаживался, но известны случаи зависимости от других веществ с точно таким же фармакологическим действием.

10) Большинство отбивок опциональны, и в небольших дозах возможно перенести побочки дополнительных компонентов препарата без проблем, однако для больших доз лишние компоненты могут подпортить трип и здоровье. Для препаратов с парацетамолом отбивка холодной водой обязательна, так как парацетамол крайне ядовит!

**КЩЭ** (пример для DXM): Берем 50 мл воды комнатной температуры. Берем щелочь (NaOH) 8-10 г (примерно чайная ложка без горки) на каждые 200 мг декстрометорфана плюс еще 8г. Аккуратно добавляем щелочь в воду (не наоборот!) небольшими порциями, тщательно размешиваем. При растворении щелочи раствор сильно нагревается. Вливаем раствор щелочи в емкость А (пластиковая бутылка 1.5-2 литра), высыпая туда же гранулы из капсул тофф+, закрываем крышкой и взбалтываем. Жидкость помутнеет и окрасится в желтоватый, зеленоватый или другой цвет. Добавляем в емкость А еще 50 мл воды и взбалтываем до полного растворения (жидкость станет темно-коричневой или красноватой). Отмеряем 20-40 мл неполярного растворителя (нефрас, бензин галоша) и вливаем в емкость А. Закрываем крышкой и сильно трясем 5-10 минут. Позволяем отстояться до полного разделения слоев. Для лучшего разделения слоев можно поставить бутылку в ведро с горячей водой. После разделения слоев растворитель остается сверху. Прикрепляем к большому (20 мл) шприцу трубку и аккуратно вытягиваем растворитель. Пену между слоями можно сбить потряхиванием или нагреванием в горячей воде. Выливаем растворитель в емкость Б (пластиковая бутылка 0.5 литра). Повторяем шаги начиная с добавления растворителя еще 2-4 раза, только трасти уже можно не 5-10 а 2-3 минуты. Альтернативно процессу со шприцем, можно добавлять больше растворителя и сливать слой без растворителя переворачивая бутылку, через проделанную в крышке дырку, затыкая дырку рукой в резиновой перчатке когда останется один растворитель. После этого отмеряем 80 мл теплой воды и растворяем в ней 1 грамм лимонной кислоты (половина чайной ложки). Вливаем раствор лимонной кислоты в емкость Б. Закрываем крышкой и сильно трясем 3-5 минут. Позволяем отстояться до полного разделения слоев. После разделения слоев раствор лимонной кислоты остается снизу. При помощи шприца с трубкой аккуратно вытягиваем нижний слой. Вливаем раствор в емкость В. Альтернативно, сливаем через дырку. Растворитель сохраняем для дальнейшего использования. Выпариваем остатки бензина из раствора, употребляем.

**КЩЭ + Сода:** Все аналогично предыдущему примеру, но вместо выпаривания проделываем дополнительные манипуляции. Берем 3-4 грамма кальцинированной соды (карбонат натрия, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>), 3 грамма это примерно 1 чайная ложка. Добавляем карбонат натрия в емкость В и тщательно размешиваем. Раствор мутнеет, затем в нем выпадают в осадок белые хлопья. Ставим емкость В в морозильную камеру на 15-20 минут. Медленно размораживаем раствор. Готовим шприц с фильтром-ватой, намотанной на иглу или носик шприца. Аккуратно вытягиваем жидкость шприцом и выливаем. В емкости остается белый или сероватый осадок - декстрометорфан-основание.

**Холодная вода** (для кодеина): Расталкиваем таблетки в мелкий порошок. Высыпаем в стакан, заливаем горячей (но не кипящей) водой, примерно в 10 раз больше чем порошка. Тщательно мешаем. После этого ставим в холодильник и ждем пока остынет, должно будет выпасть значительное количество осадка. Отфильтровываем через марлю или кофе-фильтр, осадок остается на фильтре, это парацетамол, его выбрасываем. Отфильтрованный раствор выпариваем, полученные кристаллы соскребаем, это кодеин.

**Спирт** (для бензидамина): Берем рюмку, высыпаям туда пакет розы. Заливаем ледяным спиртом или водкой из морозилки полную рюмку. Мешаем пару минут. Ждем когда осадок опустится на дно. Аккуратно сливаем спирт в другую тару, осадок выбрасываем (это соль). Повторяю процедуру с мешанием и осаждением 1-2 раза. После этого выпариваем. Ставим кастрюлю с водой на плиту, на нее широкую плоскую тарелку вместо крышки. Выливаем на тарелку спиртовой экстракт, при необходимости подливаем в процессе выпаривания. Ждем пока спирт почти весь испарится, после чего снимаем тарелку и оставляем пока не испарятся остатки спита. Получаем на тарелке кристаллы, соскребаем в порошок, это бензидамин.

**Выпаривание** (для фенбарбитала): Выливаем корвалол на большой поднос и оставляем в хорошо проветриваемом помещении. Ждем пока не останутся сухие белые кристаллы, соскребаем их, это фенбарбитал. Чтобы получить значительное количество фенбарбитала придется повторять несколько раз.

11) **Без рецепта** - препарат официально продается без рецепта. **Легко** - препарат формально продается по рецепту, но его почти никогда не спрашивают. **Средне** - препарат продается по рецепту, и у вас его могут спросить, возможно придется обойти несколько аптек пока продадут. **Тяжело** - препарат продается по рецепту, и его почти всегда спрашивают и часто отказывают при его отсутствии, возможно придется обойти большое количество аптек, или заказывать препарат онлайн. **ПКУ** - препарат на строгой учетности и его не продадут ни в какую, нужны поддельные рецепты, и такие препараты имеются лишь в малом количестве аптек. **Список III** - оборот препарата ограничен, в целом то же что и ПКУ, но аптек торгующих ими еще меньше. **Список I/II** - оборот препарата запрещен, получить можно только нелегально. За заказ препаратов из списков психотропных и наркотических веществ по почте у барыг может быть уголовка, при приминялове на кладе аналогично. За заказ препаратов ПКУ не из списков может быть административка или уголовка, если вам пришлют особо крупный размер с целью распространения. За перепродажу списковых препаратов так же будет уголовка. Внимание, если вы заказываете ПКУ препараты через интернет, никогда не палите адреса магазинов и серийные номера пачек - по ним ваш канал поставок могут прикрыть мусора. **Нет в аптеках** - препарат не запрещен и не ограничен, но официально не продается, и как правило заказывается онлайн в магазинах, торгующих зарубежной фармой и БАДами. **Ветаптека** - препарат заказывается онлайн в магазинах, снабжающих ветеринарные учреждения.

12) Магний продается в аптеках в виде цитрата, хелата, или лактата. Все это счастье довольно дорогое. Простой магний типа сульфатных удобрений не подойдет, так как он не усваивается, хотя химики могут попробовать сварить из него цитрат. Пить 100-400 мг в пересчете на чистый магний, до, во время, и на отходах. Уменьшает мерзкие побочки вроде высокого давления, аритмии, бессоницы. Ниацин (никотиновая кислота) продается так же в аптеках, и стоит относительно дешево. Помогает от сужения сосудов, которое может проявляться в виде боли в конечностях (особенно пальцах), головной боли, стенокардии. Пить по 10-20 мг во время действия стимулятора, как только начинают ощущаться побочки. Действует недолго, но передознуться сложно, поэтому можно кидать например раз в час.

13) Здесь и далее, эффекты, способные в комбинациях между собой вызывать серотониновый синдром, выделены красным. Симптомы серотонинового синдрома: очень высокая температура с лихорадкой, очень высокий пульс и давление, судороги, тремор, непроизвольные движения, агитация, спутанное сознание, бессонница, тошнота, рвота, понос. Длится от 1 до 3 суток, в тяжелых случаях может быть смертелен, спасают только бензодиазепины, при отсутствии бензодиазепинов можно попробовать фенбарбитал.

14) HPPD - hallucinogen persisting perception disorder, длительное галлюцинаторное расстройство восприятия, по-простому глюки на трезвую голову. Обычно проявляется как мелкие визуалы, как то визуальный снег на поверхностях (типа помех по телевизору), летающие черные мушки, дергающиеся и двигающиеся объекты, ореолы вокруг объектов, легкие морфи и трейсеры, цветные пятна света видимые в темноте, измененное восприятия цвета; иногда с аудио эффектами вроде шума и писка в ушах. Длится месяцами и очень быстро начинает раздражать и мешать. Проходит само при условии воздержания от употребления любых галлюциногенных веществ.

15) Примерная схема лесенки для баклофена с помощью нобена и мексидола (1/1/1 - утро/день/вечер) -

1 день: 250мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

2 день: 225мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

3 день: 200мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

4 день: 175мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

5 день: 150мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

6 день: 125мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

7 день: 100мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

8 день: 75мг баклофена + 30мг нобена + 2/2/1 125мг мексидола

9 день: 50мг баклофена + 30мг нобена + 2/2/1 125мг мексидола

10 день: 25мг баклофена + 30мг нобена + 2/2/1 125мг мексидола

11 день: 60мг нобена + 2/1/1 125мг мексидола

12 день: 60мг нобена + 2/1 125мг мексидола

13 день: 60мг нобена + 1/1 125мг мексидола

14 день: 60мг нобена + 1/1 125мг мексидола